



Coenzima Q10 0,1% - Vitamina E TPGS 0,5% - Ipromellosa 0,2%

Brevetto Europeo

Composizione:

100 ml di **VISUDROP™** contengono:

Coenzima Q10 100 mg; Vitamina E TPGS (D- α -tocoferil polietilenglicole 1000 succinato) 500 mg; Ipromellosa 200 mg; Soluzione Isotonica tamponata q.b. a ml 100.

Coenzima Q10:

Il Coenzima Q10, molecola di natura liposolubile biosintetizzata dall'organismo, è un componente di tutte le membrane cellulari ed in particolar modo delle membrane mitocondriali. I mitocondri sono degli organuli intracellulari che garantiscono la produzione energetica alle cellule.

Il Coenzima Q10 inoltre è un'importante molecola ad azione antiossidante che interviene in tutti quei processi in cui si verifica una eccessiva produzione di Radicali Liberi dell'Ossigeno (ROS).

Vitamina E TPGS:

La Vitamina E TPGS, D- α -tocoferil polietilenglicole 1000 succinato, è una vitamina liposolubile con un forte potere antiossidante. È in grado di contrastare l'ossidazione dei grassi polinsaturi delle membrane cellulari.

Il legame con il polietilenglicole trasforma la vitamina E in un veicolo in grado di rendere solubili in acqua due molecole lipofile come il Coenzima Q10 e la Vitamina E.

Ipromellosa (HPMC):

L'ipromellosa è un derivato della cellulosa, un polimero semisintetico dotato di proprietà mucomimetiche, idratanti e viscosizzanti per il film lacrimale.

Indicazioni:

VISUDROP™ è una soluzione oftalmica sterile senza conservanti con Coenzima Q10, Vitamina E TPGS, due molecole ad azione antiossidante ed Ipromellosa ad azione viscosizzante e lubrificante.

VISUDROP™ svolge un'azione lubrificante ed integra le naturali difese antiossidanti, in presenza di stress ossidativo, in caso di:

- secchezza oculare
- alterazioni della continuità della superficie corneale e congiuntivale dopo chirurgia refrattiva, trauma da corpo estraneo ed interventi chirurgici
- patologie metaboliche (diabete)
- stress ambientale (smog, acqua clorata, microclimi alterati, fumo, aria condizionata)
- intensa e prolungata esposizione a radiazioni UV e ionizzanti
- uso prolungato di computer, videotermini, televisione

Come si applica VISUDROP™?

Prima dell'uso staccare il singolo flaconcino tirandolo verso di voi. Ruotare quindi il tappo su se stesso: il flaconcino monodose è aperto.

A questo punto instillare 1-2 gocce del preparato nel sacco congiuntivale, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Richiudere correttamente il monodose dopo l'uso.

Il contenuto di ciascun flaconcino può essere utilizzato fino a 24 ore dalla prima apertura.

Quali altre indicazioni devono essere rispettate ai fini dell'applicazione?

VISUDROP™ non dovrebbe essere impiegato subito prima della somministrazione di medicinali per gli occhi, e almeno 5 minuti dopo l'applicazione di una eventuale terapia farmacologica. In ogni caso, le pomate oftalmiche dovrebbero essere applicate dopo la somministrazione di **VISUDROP™** nel sacco congiuntivale.

Con quale frequenza e per quanto tempo dovrebbe essere impiegato VISUDROP™?

VISUDROP™ dovrebbe essere dosato individualmente secondo il proprio stato e in base alle raccomandazioni del proprio oculista. In generale, applicate 1 - 2 gocce di **VISUDROP™** nel sacco congiuntivale di ciascun occhio al momento del bisogno, anche più volte al giorno.

Avvertenze

- Il flaconcino monodose, non contiene conservanti: se correttamente chiuso, può essere utilizzato fino e non oltre le 24 ore successive alla prima apertura;
- Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti e sospenderne l'uso, rivolgendosi al proprio oculista, nel caso di comparsa di reazioni avverse;
- Evitare che la punta del flaconcino entri in contatto con l'occhio o con altre superfici;
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato;
- Lavare le mani prima e subito dopo l'applicazione del prodotto;
- Tenere il flaconcino monodose lontano da fonti di luce e di calore e dalla portata dei bambini;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- Non ingerire;

Confezione

10 monodose richiudibili da 0,50 ml.

Fabbricante

Visufarma S.p.A. - Via Canino, 21 - 00191 Roma